




## ПРАВИЛА СДАЧИ АНАЛИЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИТРА АНТИТЕЛ К ВИРУСУ БЕШЕНСТВА

Отбор материала (кровь)  
производится в  
специализированную  
пробирку без наполнителя  
(с белой крышкой):



1. АНАЛИЗ ПРОВОДИТСЯ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТ БЕШЕНСТВА И ЗА 2 МЕСЯЦА ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ВАКЦИНЫ.
2. ЖИВОТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИПИРОВАНО!
3. ВОЗРАСТ ЖИВОТНОГО ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 4x МЕСЯЦЕВ.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ПАСПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА (ФИО ВЛАДЕЛЬЦА И КЛИЧКА ЖИВОТНОГО ЗАПОЛНЕНЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ).
5. НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫВОРОТКИ:

1. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ СЫВОРОТКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +4°C...+8°C НЕ БОЛЕЕ 2x СУТОК.
2. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ХРАНЕНИЯ БОЛЕЕ 2x ДНЕЙ, ОТЦЕНТРИФУГИРОВАННУЮ ОТДЕЛЕННУЮ СЫВОРОТКУ ЗАМОРАЖИВАЮТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20°C.
3. СЫВОРОТКА КРОВИ НЕ ДОЛЖНА ПОДВЕРГАТЬСЯ РАЗМОРАЖИВАНИЮ.

### К исследованию НЕ ПРИНИМАЕТСЯ:

- ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ ИЛИ ОБРАЗЦЫ С ПРИМЕСЬЮ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ;
- СЫВОРОТКИ КРОВИ С СИЛЬНЫМ ГЕМОЛИЗОМ (ТЕМНО-КРАСНОГО ЦВЕТА);
- СЫВОРОТКИ КРОВИ С ОСАДКОМ, МУТНЫЕ, С ГНИЛОСТНЫМ ЗАПАХОМ.